
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ХАКИМОВ М. А.

SPECIFIC DIAGNOSTICS OF PROSTATA GLAND TUBERCULOSIS

KHAKIMOV M. A.

РСНПМЦ ФиП МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Phthisiology and Pulmonology, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Своевременное выявление туберкулеза предстательной железы с проведением дифференциальной диагностики в условиях противотуберкулезных учреждений с использованием диагностической базы, современных возможностей микробиологических, эхографических, морфологических методов позволит достигнуть излечения и полной социально-трудовой реабилитации больных. Поздняя диагностика заболевания ведет к стойкой инвалидности больных.

Цель: изучить значение клинико-эхографических исследований в раннем выявлении туберкулеза предстательной железы.

Материалы и методы. В клинике РСНПМЦ ФиП МЗ РУз комплексному клинико-эхографическому обследованию подвергнуты 64 больных с различными формами туберкулеза предстательной железы. Возраст больных туберкулезом предстательной железы колебался от 17 до 68 лет. У 24 (37,5%) пациентов в анамнезе отмечен перенесенный туберкулез, из них туберкулез легких был у 25 больных, туберкулез почек – у 13, туберкулез костей и суставов – у 6, туберкулез периферических лимфатических узлов – у 3. При поступлении в клинику основными жалобами больных были боли в надлобковой области, затрудненное

и болезненное мочеиспускание, выделение крови с мочой. В моче более выражены были лейкоцитурия (78,0%), гематурия (46%) и туберкулезная микобактериурия (26,5%). При эхографии выявлена неоднородная эхоструктура предстательной железы в 89,2% случаев, очаговые изменения в паренхиме предстательной железы – в 82,8%, диффузные – в 17,2% случаев. При туберкулезном простатите четкие эхографические признаки заболевания встречались в 83,3% случаев. Рентгенологические четкие признаки туберкулеза простаты в этих группах больных не обнаружены. По биопсии, проведенной у 6 пациентов с туберкулезом предстательной железы, только у одного больного не получено данных, свидетельствующих о специфическом процессе.

Заключение. Четкие признаки туберкулеза предстательной железы установлены на эхограммах в 83,3% случаев. Эхография предстательной железы при туберкулезе обеспечивает получение дополнительной информации о характере и распространенности специфического процесса. Ценность этого метода заключается в возможности многовариантного его использования не только в целях диагностики, но и для контроля в процессе лечения и в послеоперационном периоде.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

ХАКИМОВ М. А., САДЫКОВА С.

CONCURRENT CONDITIONS IN PULMONARY TUBERCULOSIS PATIENTS

KHAKIMOV M. A., SADYKOVA S.

Ташкентский областной противотуберкулезный диспансер, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Tashkent Regional TB Dispensary, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Для туберкулеза легких характерно частое развитие сопутствующих заболеваний. Противотуберкулезное лечение больных данной

категории в значительной степени затруднено плохой переносимостью противотуберкулезных препаратов.